

Hechos sobre la sífilis

¿Qué es la sífilis?

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS/STD) que se transmite por contacto directo durante el sexo vaginal, anal u oral. Si no se trata, puede causar daños en el cerebro, los nervios, los tejidos y la muerte.

¿Quién contrae sífilis?

Cualquier persona puede contraer sífilis. En Denver, es más común entre los hombres que tienen sexo con hombres.

¿Cuál es el vínculo entre la sífilis y VIH?

Las llagas de la sífilis oral, anal, vaginal o del pene hacen más fácil que se transmita el virus del VIH. Una persona tiene de 2 a 5 veces más probabilidad de contraer el VIH si está expuesto al VIH cuando tiene llagas de sífilis.

Resumen de los síntomas

Los síntomas primarios y secundarios aparecen de 10 a 90 días después de la infección e incluyen:

- Una úlcera firme, redonda y que no duele en el pene, la vagina, el ano, los labios o la boca.
- Salpullido o llagas en la piel de los mismos lugares, o en las manos y los pies.

Qué hacer si el resultado de la prueba es positiva

- No preocuparse. La sífilis puede curarse con antibióticos.
- Abstenerse de tener relaciones sexuales hasta que se curen las llagas.
- Comunicarse con todas las personas con las que haya tenido sexo para que esas personas puedan hacerse pruebas.

Cómo protegerse a usted mismo y proteger a otros

Los síntomas de la sífilis no siempre son obvios.

Protéjase haciendo lo siguiente:

- Haciéndose pruebas de rutina para enfermedades de transmisión sexual.
- Practicando siempre sexo seguro, hablando con sus parejas sobre las enfermedades de transmisión sexual antes de tener relaciones sexuales y usando condones.
- Evitando el sexo si ve llagas o sarpullido, especialmente en el área de la ingle.
- Teniendo relaciones sexuales en una relación monógama con una pareja no infectada.



Recomendaciones de pruebas

La sífilis se diagnostica a través de un simple análisis de sangre. Denver Public Health recomienda pruebas de rutina a:

- Los hombres que tienen sexo con hombres (cada 6 meses)
- Las personas infectadas con el VIH (cada 3 - 6 meses)
- Las mujeres embarazadas (en visita prenatal y durante el tercer trimestre, si tienen múltiples compañeros sexuales)
- Las personas que tienen una pareja que ha tenido resultados positivos para sífilis (de inmediato)